



## ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะ

231/1 หมู่ 8 ถนนสวัสดิภาพพิสุทธิ์ ตำบลนาแก อำเภอเกาะ จังหวัดนครพนม โทร. 0-4257-1236

\*\*\*\*\*

### แนะนำให้เกษตรกรให้น้ำล้นจี่อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคผลแตก

สวนล้นจี่ของจังหวัดนครพนม ขณะนี้อยู่ในช่วงติดผลและผลกำลังพัฒนาจากผลเล็กไปสู่ผลสมบูรณ์ ซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งสภาพอากาศแปรปรวน หากฝนตกมากเกินไป หรือให้น้ำอย่างกะทันหันมากเกินไป จะทำให้ล้นจี่เป็นโรคผลแตกได้ แนะนำให้เกษตรกรให้น้ำล้นจี่ที่ละน้อยและสม่ำเสมอในระหว่างผลล้นจี่กำลังพัฒนาจากผลเล็กไปสู่ผลสมบูรณ์ จะป้องกันไม่ให้ล้นจี่เป็นโรคผลแตกได้

จังหวัดนครพนมมีพื้นที่ปลูกล้นจี่พันธุ์ นพ. 1 ประมาณ 350 ไร่ ปลูกมากที่อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งล้นจี่พันธุ์ นพ. 1 นี้ จะเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนล้นจี่ทางภาคเหนือ คือเก็บเกี่ยวช่วงเดือนเมษายน ซึ่งทำให้ราคาผลผลิตสูง ราคาในปี 2555 ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 50 บาท ரசขาดหวานอมเปรี้ยว จากสถิติที่ผ่านมาในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม สภาพอากาศของจังหวัดนครพนมแปรปรวน กลางวันอากาศร้อนจัด กลางคืนอากาศเย็นสลับกับมีฝนตก ทำให้ล้นจี่อาจเป็นโรคผลแตก ซึ่งลักษณะอาการของโรคเป็นดังนี้

**สาเหตุ** ล้นจี่ได้รับน้ำหรืออาหารไม่เพียงพอในระหว่างที่ผลล้นจี่กำลังพัฒนาให้เป็นผลสมบูรณ์

**ลักษณะอาการ** เปลือกผลแตกตามความยาวของบริเวณก้านผลในระยะที่ผลล้นจี่กำลังสร้างเนื้อผลหุ้มเมล็ดและระยะที่เปลือกผลเริ่มเปลี่ยนสี ต่อมาเนื้อผลเน่า เนื่องจากมีจุลินทรีย์เข้าทำลายซ้ำเติม

**การแพร่ระบาด** เป็นโรคที่ไม่ติดเชื้อไม่มีการระบาด

**การป้องกันกำจัด**

1. ให้น้ำล้นจี่ที่ละน้อยและสม่ำเสมอในระหว่างผลล้นจี่กำลังพัฒนา
2. ให้อาหารรองและอาหารเสริม เช่น ธาตุแคลเซียม โบรอน สังกะสี ทองแดง และแมกนีเซียม เพื่อให้เซลล์ของผลแข็งแรงไม่แตกง่าย
3. ให้อาหาร สูตร 13-13-21 จำนวน 3-5 กก./ต้น แบ่งใส่ 3 ครั้ง ระยะติดผล ขนาด 5 ม.ม. ระยะผลโตปานกลางและระยะก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน เพื่อเพิ่มคุณภาพและความหวานของล้นจี่

ดังนั้น จึงขอแนะนำให้เกษตรกรดูแลล้นจี่ นพ.1 ให้ดี โดยการให้น้ำและปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำข้างต้น ก็จะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพไม่เป็นโรคผลแตก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม โทร 0-4251-3412

งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ข่าว