



ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช  
สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก

231/1 หมู่ 8 ถนนสวัสดิภาพพิสุทธิ์ ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โทร. 0-4257-1236

\*\*\*\*\*

เตือนการระบาดของศัตรูพืช  
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556  
หนอนโยมผัก

เกษตรกรที่ปลูกผักเป็นการค้า โดยเฉพาะพืชผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด ควรหมั่นสำรวจแปลงผักอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชศัตรูที่คอยทำลายพืชผักให้ได้รับความเสียหายและระบาดเป็นประจำตามแหล่งปลูกผักทั่วไปที่สำคัญคือ หนอนโยมผัก หรือที่เรียกชื่อทั่วไปว่า หนอนโย-ตัวจรวด ซึ่งตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก วางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ หรือกลุ่มเล็ก ๆ ตามส่วนยอดของพืชผักทั้งบวบและโถงใบ ไข่มีสีเหลืองอ่อน หนอนลำตัวยาวเรียว หัวท้ายแหลมสีขาวยาวล หนอนจะทิ้งตัวโดยการชักใย เมื่อถูกรบกวนเข้าคักแต่ตามใบพืช ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่จะเริ่มกัดกินใบและยอดเป็นรูพรุน หนอนโยมผักขยายพันธุ์รวดเร็ว วงจรชีวิตสั้น มีหลายรุ่นระบาดได้ตลอดปี

กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดดังนี้

1. เก็บเศษผักออกจากแปลงหลังเก็บเกี่ยว ถ้าทิ้งไว้จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
2. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ทั้งตัวห้ำ-แตนเบียน เช่น มวนคาโต คอชนิดต่างๆ จิ้งหรีดหนวดยาว ค้างคาน แมลงปอน้ำ แมลงปอเสือ มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาต แตนเบียนไข่-หนอน
3. ใช้กับดักกาวเหนียว 80 กับดัก/ไร่
4. ใช้เรือดากถ่ายใบอ่อนหรือปลูกผักกางมุ้ง
5. ใช้การปล่อยแตนเบียนไข่ 60,000 ตัว/ไร่ทุก 10 วัน
6. ใช้ บีที(เซนทารี) อัตรา 40 - 80 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 4- 7 วัน เมื่อพบการระบาด
7. ใช้ไส้เดือนฝอยอัตรา 1 ของ/น้ำ 2 ลิตร พ่น 2 ครั้งห่างกัน 15 วัน หลัง 17.00 น.
8. ใช้เม็ลลัสเดาบาด แช่น้ำ 1 กก./น้ำ 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง
9. ใช้คลอร์ฟิธาเพอร์(แรมเพจ 10% SC) อัตรา 20 - 40 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือ สปินโนแซค(ซิกเซค 120 12% SC) อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร งดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 7 วัน พ่นติดต่อกัน 2 - 3 ครั้ง เมื่อพบการระบาดรุนแรง

งานอารักขาพืช  
ข่าว