



ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช
สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก

231/1 หมู่ 8 ถนนสวัสดิภาพพิสุทธิ์ ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โทร. 0-4257-1236

เตือนการระบาดของศัตรูพืช

โรคราแป้ง

เกษตรกรที่ปลูกมะม่วงบริเวณที่สูงทางภาคเหนือ ควรระวังโรคราแป้งในระยะมะม่วงออกดอก เนื่องจากในช่วงนี้มีอากาศหนาวเย็น หากพบอาการของโรคราแป้งควรทำการควบคุม ก่อนที่เชื้อจะเข้าทำลายและแสดงอาการ ดังนี้

เกษตรกรที่ปลูกมะม่วงบริเวณที่สูงทางภาคเหนือ ควรระวังโรคราแป้งในระยะมะม่วงออกดอก เนื่องจากในช่วงนี้มีอากาศหนาวเย็น หากพบอาการของโรคราแป้งควรทำการควบคุม ก่อนที่เชื้อจะเข้าทำลายและแสดงอาการ ดังนี้

ลักษณะอาการ

พบระบาดทั่ว ๆ ไปในแหล่งปลูกมะม่วงของประเทศต่าง ๆ ในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบในมะม่วงที่ปลูกบริเวณที่สูงทางภาคเหนือ สามารถเข้าทำลายได้ทั้งใบ ดอก ช่อดอก และผลอ่อน

การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด

อาการที่ใบอ่อน

จะเห็นบริเวณที่เชื้อราเข้าทำลายเป็นชุยหรือผงสีขาวขึ้นบาง ๆ ส่วนใหญ่จะพบได้ใบ อาการต่อมาบริเวณที่เป็นโรคจะมีสีเหลืองจาง ถ้าสภาพอากาศเหมาะสมเป็นผงสีขาว ๆ ชัดเจนขึ้น หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนและเข้มขึ้นตามลำดับ ถ้าเกิดโรครุนแรงใบอาจจะบิดเบี้ยวเสียรูปทรงไป ร่วงหล่น หรือแสดงอาการเนื่อใบไหม้

อาการที่ช่อดอก

จะพบผงสีขาวขึ้นฟูตามก้านช่อดอกย่อย และดอก ซึ่งจะทำได้ดอกร่วงไม่ติดผล ส่วนของก้านช่อดอกจะยังคงมีสีขาวปกคลุม แล้วจะค่อย ๆ เป็นสีน้ำตาลอ่อน โรคนี้มักจะพบในช่วงฤดูหนาว เมื่อมะม่วงเริ่มออกดอก และมักจะพบร่วมกับช่อดอกที่อยู่บริเวณตอนล่าง หรือกลาง ๆ ลำต้น หรือช่อดอกที่อยู่ในพุ่ม ดอก และก้านช่อดอกที่ถูกเชื้อราเข้าทำลาย การเจริญเติบโตจะลดลง ดอกไม่บาน และร่วงในที่สุด แต่บางครั้งสามารถทนได้จนถึงติดผลอ่อน

การแพร่ระบาด ในแหล่งปลูกมะม่วงทั่วไป มักพบทำลายช่อดอกในฤดูหนาวประมาณเดือน ธันวาคม - มกราคม

การป้องกันกำจัด

หมั่นตรวจดูอาการของโรคที่ใบอ่อน ช่อดอก และที่ผลอ่อน เมื่อพบให้ตัดส่วนที่เป็นโรคนำไปเผาทำลายการป้องกันกำจัดโรคราแป้ง ที่ระบาดในระยะมะม่วงออกดอก ทำการฉีดพ่นสารเคมีในช่วงที่ดอกยังไม่บานครั้งหนึ่ง หากยังมีโรครบาดอยู่ ก็ควรฉีดอีกครั้งในระยะติดผลอ่อน สารเคมีที่ใช้ป้องกันกำจัดโรคราแป้ง ได้แก่ dinocap, benomyl, triadimefon และกำมะถันผง เป็นต้น

งานอารักขาพืช
ข่าว